

Teratogenicidade Farmacológica: Medicamentos Absolutamente Contraindicados na Gestação — Seguimento Farmacoterapêutico Ambulatorial e Adesão (Dia 0134)

Por Cristiano Ricardo · Publicado em 30/06/2026

Análise clínica e farmacoterapêutica do Dr. Cristiano Ricardo sobre Teratogenicidade Farmacológica: Medicamentos Absolutamente Contraindicados na Gestação. Foco em Obstetrícia & Farmacoterapia na Gestação e Lactação e Farmacoterapia & Seguimento Farmacoterapêutico: avaliação de prescrição, interpretação de exames laboratoriais (Paciente relata atraso menstrual de 2 semanas; beta-hCG solicitado pelo farmacêutico resulta POSITIVO (gravidez de 5 semanas confirmada).), identificação do erro/risco po

Versão online e eventuais atualizações:

<https://professor.cristianoricardo.com/post/clinica-farmaceutica-dia-0134-teratogenicidade-farmacologica-medicamentos-absolutamente>

Obstetrícia & Farmacoterapia na Gestação e Lactação · Farmacoterapia & Seguimento Farmacoterapêutico

Teratogenicidade Farmacológica: Medicamentos Absolutamente Contraindicados na Gestação — Caso Clínico #0134

Diretriz Pedagógica de Cuidado Farmacêutico · Dr. Cristiano Ricardo · Publicação de 30/06/2026

A presente lição clínica integra o programa diário de capacitação e prática farmacêutica avançada do Dr. Cristiano Ricardo.

Sob o tema Teratogenicidade Farmacológica: Medicamentos Absolutamente Contraindicados na Gestação, abordamos a tomada de decisão clínica à beira do leito hospitalar e no consultório, unindo o raciocínio fisiopatológico às evidências farmacológicas modernas e à legislação profissional vigente.

Enquadramento Regulatório & Deontologia: Esta conduta farmacêutica fundamenta-se na Resolução CFF nº 585/2013, Protocolos de Atenção Básica e Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, assegurando autonomia técnica, responsabilidade sanitária e prevenção ativa de iatrogenias medicamentosas.

1. Apresentação do Caso Clínico & Anamnese Farmacêutica

Perfil do Paciente e Admissão: Mulher jovem de 24 anos, com acne cística nódulo-ulcerativa e histórico de dislipidemia, comparece à farmácia para dispensação de Roacutan.

Prescrição Médica Auditada: Isotretinoína 30mg/dia prescrita sem teste de gravidez anexado ou termo de consentimento.

2. Interpretação Farmacêutica de Resultados Clínicos e Laboratoriais

O farmacêutico deve correlacionar imediatamente a farmacocinética dos medicamentos prescritos aos parâmetros bioquímicos e hematológicos do paciente:

- Achados Laboratoriais Críticos: Paciente relata atraso menstrual de 2 semanas; beta-hCG solicitado pelo farmacêutico resulta POSITIVO (gravidez de 5 semanas confirmada).
- Risco Terapêutico Detectado na Prescrição: Teratogênico absoluto de Categoria X: a exposição à isotretinoína no primeiro trimestre causa malformações congênitas severas em mais de 30% a 50% dos fetos (malformações craniofaciais, microtia, cardiopatias conotrunciais graves e hidrocefalia).
- Substâncias e Alvos Envolvidos: Isotretinoína / Talidomida / IECAs e BRAs / Metotrexato

3. Avaliação Crítica da Prescrição & Racional Fisiopatológico

O farmacêutico é a última barreira de proteção entre o medicamento teratogênico e o conceito. O controle rígido do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC) e a exigência de dupla contracepção e testes negativos mensais de gravidez são mandamentos inquebrantáveis.

4. Intervenção Farmacêutica Estruturada & Plano de Cuidado

Conduta Farmacêutica Adotada (Método SOAP / Dáder / PCNE):

Recusa técnica e sanitária fundamentada de dispensação pelo farmacêutico com base na Portaria SVS/MS nº 344/1998 e no Código de Ética Farmacêutica (Resolução CFF nº 711/2021); acolhimento e aconselhamento da paciente com encaminhamento urgente para serviço de pré-natal de alto risco; notificação ao prescritor e ao sistema de farmacovigilância.

5. Perólas Clínicas e Recomendações para a Prática Diária

- Documentação em Prontuário: Registre formalmente toda intervenção farmacêutica utilizando a metodologia SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano), resguardando a equipe e

conferindo rastreabilidade sanitária.

- Comunicação Interprofissional Efetiva: Ao sugerir ajustes posológicos ao médico assistente, apresente o racional fisiopatológico, o risco toxicodinâmico documentado e a proposta alternativa concreta pronta para validação.
- Engajamento do Paciente (Teach-Back): Em ambiente ambulatorial, certifique-se de que o paciente ou cuidador compreendeu os horários, interações com alimentos e sinais precoces de alarme que exigem pronto-socorro.

Dr. Cristiano Ricardo

Farmacêutico Clínico e Hospitalar · Especialista em Farmacoterapia & Cuidado Farmacêutico