

# Complexos Estomáticos e Diagnóstico Farmacopeico: Anomocítico, Diacítico, Paracítico e Anisocítico (Tratado de Farmacobotânica 2016)

Por Cristiano Ricardo · Publicado em 29/04/2016

Tratado aprofundado de farmacobotânica aplicada à farmácia e microscopia vegetal pelo Prof. Cristiano Ricardo sobre complexos estomáticos e diagnóstico farmacopeico: anomocítico, diacítico, paracítico e anisocítico (Anatomia Foliar & Micromorfologia Vegetal), com anatomia vegetal diagnóstica e diagramas esquemáticos.

Versão online e eventuais atualizações:

<https://professor.cristianorcardo.com/post/complexos-estomaticos-e-diagnostico-farmacopeico-anomocitico-diacitico-paracitico-e-anisocitico>

---

## Anatomia Foliar & Micromorfologia Vegetal · Farmacobotânica & Farmacognosia Diagnóstica

A disposição geométrica e a ontogenia das células anexas ao redor das células-guarda dos estômatos constituem um dos marcadores anatômicos mais confiáveis para a autenticação farmacopeica de drogas vegetais.

## Morfologia Diagnóstica & Esquema Anatômico

### Anomocítico

Células anexas  
indiferenciadas

### Diacítico

2 células anexas  
perpendiculares

### Paracítico

2 células anexas  
paralelas ao poro

### Anisocítico

3 células anexas  
(1 bem menor)

## Classificação Ontogenética e Morfológica dos Estômatos

Estômatos anomocíticos (tipo Ranunculaceae) são delimitados por células indistinguíveis das demais células epidérmicas comuns (ex: *\*Digitalis purpurea\**); estômatos diacíticos (tipo Caryophyllaceae) apresentam duas células anexas dispostas em ângulo reto perpendicular em relação ao ostíolo (ex: *\*Mentha piperita\**); estômatos paracíticos (tipo Rubiaceae) possuem células anexas paralelas ao eixo longitudinal das células-guarda (ex: *\*Senna alexandrina\**); e estômatos anisocíticos (tipo Cruciferae/Solanaceae) são envolvidos por três células anexas, sendo uma nitidamente menor que as demais (ex: *\*Atropa belladonna\**).

## Índice Estomático (IE) como Parâmetro Farmacopeico Absoluto

Diferente da densidade estomática pura, que varia amplamente com a insolação e disponibilidade hídrica, o Índice Estomático representa a razão percentual entre estômatos e o total de células epidérmicas:  $IE = [E / (E + C)] \times 100$ . Como permanece constante para uma mesma espécie vegetal em folhas maduras, o IE diferencia espécies morfológicamente idênticas, como folhas genuínas de sene de adulterantes silvestres.

## Importância na Autenticidade de Pós de Folhas Medicinais

Em pós triturados onde a morfologia foliar macroscópica foi destruída, fragmentos microscópicos de epiderme preservando o complexo estomático permitem atestar se o material atende às especificações da Farmacopeia Brasileira e Farmacopeia Europeia.

Prof. Cristiano Ricardo

Farmacêutico-Bioquímico · Especialista em Farmacobotânica, Farmacognosia & Fitoquímica Estrutural · Publicação de 29/04/2016 às 02:30